



# Armoire à pharmacie

*En fonction des risques et de l'activité de votre entreprise, veuillez contacter votre médecin du travail qui complètera l'armoire à pharmacie de base.*

Elle doit être accessible, si possible être fermée à clé.

Elle est sous la responsabilité d'une (ou plusieurs) personne(s) désignée(s) par l'employeur, qui veillera(ont) à sa mise à jour (péremption des produits).

**Elle ne doit contenir aucun produit à base d'ASPIRINE et tout traitement par voie orale est déconseillé (y compris le PARACETAMOL).**

## Antiseptique :

- Chlorhexidine en unidose si possible
  - Lingettes détergentes (sur les chantiers)
- > *Eviter l'alcool et l'éther.*

## Pommades :

- Antidouleur et antioedème

## Collyre antiseptique en unidose

## Petit matériel :

- Pince à échardes
  - Paire de ciseaux
  - Gants jetables, en vinyle
- > *Eviter le latex (risque d'allergie)*
- Alcool à 70° (désinfection du matériel)

## Autres :

- Compresses stériles individuelles 10x10
- > *Eviter le coton*
- Sparadrap hypo-allergénique
  - Pansements pré-découpés, aérés, plastifiés, hypoallergéniques
  - Produit hémostatique et cicatrisant (plaie qui saigne, saignement de nez)
  - Pansements compressifs ou coussin hémostatique d'urgence
  - Bande de contention cohésive de 5 cm, petite longueur
  - Couverture de survie
  - Kit de récupération pour doigt sectionné
  - Sucre en morceaux.

> **Vérifier le contenu de la pharmacie régulièrement (1 fois par mois).**

> **Vérifier les dates de péremption des produits et médicaments tous les 6 mois.**

> **Tenir, si possible, un cahier de suivi.**



## Précisions sur les produits contenus dans l'armoire à pharmacie

### **RAPPEL :**

*Toute blessure importante nécessite l'intervention d'un médecin  
ou l'appel au 15 pour confirmer la conduite à tenir.*

#### **Chlorhexidine :**

**Sert au nettoyage des plaies cutanées uniquement.**

**>> Ne doit pas être mis en contact avec l'œil, ne doit pas être introduit dans le conduit auditif, ne doit pas être utilisé sur une brûlure.**

Peut parfois provoquer des réactions allergiques (Interroger le blessé).

- Si les plaies sont profondes et très étendues, laver à l'eau claire puis protéger avec un pansement propre et attendre les secours.

---

#### **Pommade antidouleur et antioedème :**

- Appliquer en massant légèrement sur les contusions et les ecchymoses (bleus).
- Réaction allergique possible localisée au point d'application.
- Ne pas appliquer au voisinage immédiat des yeux, sur les plaies, sur les lésions infectées.
- Si vous disposez de glace, une compresse glacée permet de traiter efficacement les ecchymoses.

---

#### **Collyre antiseptique :**

Gouttes dans l'oeil en cas de coup d'arc selon posologie préconisée ; c'est une brûlure de la cor-  
née qui peut être grave. **Un contrôle ophtalmologique est recommandé.**